

# L-Mesitran® NET Hydro-active, honey-hydrogel coated, open weave mesh wound dressing

NEEDERLANDS

L-Mesitran Net

Productomschrijving

L-Mesitran Net is een steriel polyester verband dat bedekt is met een hydroactieve honing hydrogel, geschikt voor gebruik op acute en chronische wonden. L-Mesitran Net bevat 20% honing, water en acryl polymeren, op een polyester verband dat exudat door laat gaan naar het secundaire verband. L-Mesitran Net dient altijd samen met een geschilderd verband toegepast te worden en kan gebruikt worden in combinatie met L-Mesitran Soft en L-Mesitran Net is een multifunctionele begrenzende wondcontactlaag, waarbij de honing-hydrogel coating zorgt voor absorptie en retentie van exudaat. L-Mesitran Net helpt een vochtige wondomgeving te creëren die bevorderlijk is voor de wondgenezing.

Indications

L-Mesitran Net is indiciert bei leicht bis stark exsudierenden chronischen Wunden wie: Druckgeschwüren, Verbrennungen Grad I und II, bei venösen-, arteriellen- und Diabetes-Geschwüren, exulzerierenden/bösartigen Wunden. Es eignet sich auch für akute Wunden wie Schürfwunden, Schnittwunden, Donorsites (Transplantat- Entnahmestellen), postoperative- und anderen traumatischen Wunden.

Kontraindikationen

Niet gebruiken bij patiënten met een bekende gevoeligheid voor het verband of voor één van de componenten.

L-Mesitran Net mag niet gebruikt worden:

- Zonder een secundair verband om uitdroging te voorkomen en voor de fixatie van het verband.
- Zonder extra maatregelen bij zwaar exsuderende wonden.
- Op degradende brandwonden, diepe, smalle wonden of fistels.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

L-Mesitran Net kan gebruikt worden bij gecontamineerde en gekoloniseerde wonden. Echter wanneer wonden klinisch geïnfecteerd zijn, moet L-Mesitran Net alleen gebruikt worden indien passende medische begeleiding beschikbaar is. Eventuele verdere behandeling van de infectie dient te worden gestart volgens de lokale protocollen en onder medische begeleiding. Geschiede secundaire verbanden moeten worden gebruikt om het verband te fixeren en om uitdroging te voorkomen. Niet gebruiken indien de verpakking op eender welke wijze beschadigd is.

Gebruiksaanwijzing

1. Inspecteer en, indien nodig, reinig de wond volgens de geldende protocollen.
2. Verwijder het steriele verband uit de verpakking.
3. Verwijder het verband van de plastic ruglaag en plaatst het verband met de licht klevende zijde zachtjes op de wond.
4. Bedek en fixeer het verband met een geschilderd secundair verband.
5. Controleer de wond en het omliggende weefsel regelmatig volgens de geldende protocollen.
6. In het geval van een intolerantie voor het verband, of één van de componenten, verwijder het verband met behulp van geschikte technieken en maak het oppervlak zorgvuldig schoon.

Verbandswisseling

Het verband kan maximaal vijf dagen op de wond blijven, afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht en de behoeften van de wond. Waar nodig, kan het netverband op de wond blijven, terwijl het secundaire verband wordt vervangen. Indien het verband te droog geworden is, kan volledige en voorzichtige verwijdering van het verband geholpen worden door het een beetje vochtig te maken. Elk verband is voor eenmalig gebruik. Niet gebruiken na de vervaldatum.

Bewaren tussen 5°C en 25°C. Vermijd direct zonlicht en vocht.

ENGLISH

L-Mesitran Net

Product description

L-Mesitran Net is een steriel, open-weave mesh dressing coated with a hydroactive honey-hydrogel for use on acute and chronic wounds. L-Mesitran Net contains 20% medical grade honey, an acrylic polymer gel and water on a polyester mesh structure that allows passage of exudate through the dressing. L-Mesitran Net is to be used in conjunction with an appropriate secondary dressing, and can be used in conjunction with L-Mesitran Ointment and Soft. L-Mesitran Net is a multipurpose protective wound contact layer, where the honey-hydrogel coating provides some absorption and retention of exudate to help maintain a moist environment conducive to healing.

Indications

L-Mesitran Net is indicated for low to heavily exuding chronic wounds such as: pressure ulcers; superficial and partial thickness burns; venous, arterial and diabetic ulcers; fungating wounds. It is also indicated for acute wounds such as donor sites, surgical wounds, cuts and abrasions.

Contraindications

Do not use on individuals with a known sensitivity to the dressing or its components. L-Mesitran Net should not be used:

- Without a secondary dressing to prevent the dressing from drying out on the wound and to retain the dressing on the wound.
- On its own on heavily exuding wounds.
- On full thickness burns, deep, narrow cavities or sinuses.

Warnings and precautions

The dressing may be used on contaminated and colonized wounds. However where wounds are clinically infected, L-Mesitran Net should only be used providing appropriate medical supervision is sought. Any further treatment for infection should be initiated as per local protocols and under medical guidance. Appropriate secondary dressings should be used to prevent the dressing from drying out whilst in place. Do not use if the packaging is damaged or compromised in any way.

Instructions for use

1. Inspect and if necessary, cleanse the wound as per local protocols.
2. Remove the sterile dressing from the pouch.
3. Peel the dressing off the clear plastic backing sheet and apply the freshly-exposed side to the wound.
4. Cover and secure with the appropriate secondary dressing.
5. Inspect the wound and the surrounding tissue regularly, as per local protocols.
6. In the event of an intolerance to the dressing or one of its components, remove the dressing using appropriate techniques and clean the area carefully.

Frequency of change

The dressing can remain in place for up to five days, dependent upon the amount of wound exudate and the needs of the wound. Where appropriate, L-Mesitran Net may remain in place while the secondary dressing is changed. Complete and gentle removal of the dressing may be aided by irrigation should the dressing become too dry. Each dressing is for single use. Do not use after expiry date.

Store between 5°C and 25°C. Avoid direct sunlight and moisture.

DEUTSCH

L-Mesitran Net

Produktbeschreibung

L-Mesitran Net ist ein steriler Polyester-Netzverband, be-

schichtet mit einem hydroaktiven Honig-Hydrogel, zur Anwendung bei akuten und chronischen Wunden. L-Mesitran Net enthält 20% medizinischen Honig, Acrylpolymer und Wasser und ist eine Mehrzweck-Wundauflage, deren Honig-Hydrogelbeschichtung bis zu einem gewissen Grad Wundausscheidungen absorbiert, wodurch ein optimales, feuchtes Wundheilungsklima geschaffen wird. Überschüssiges Exsudat wird durch das lose gewebte Netz nach außen abgegeben. L-Mesitran Net muss immer zusammen mit einem geeigneten Sekundärverband (z.B. Schaumstoffverband/Mulverband) angewendet werden. L-Mesitran Net lässt sich hervorragend mit L-Mesitran Salbe oder L-Mesitran Soft Wundgelp kombinieren.

Indikationen

L-Mesitran Net ist indiziert bei leicht bis stark exsudierenden chronischen Wunden wie: Druckgeschwüren, Verbrennungen Grad I und II, bei venösen-, arteriellen- und Diabetes-Geschwüren, exulzerierenden/bösartigen Wunden. Es eignet sich auch für akute Wunden wie Schürfwunden, Schnittwunden, Donorsites (Transplantat- Entnahmestellen), postoperative- und anderen traumatischen Wunden.

Kontraindikationen

Nicht verwenden bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen den Verband oder einer seiner Bestandteile.

- Ohne einen sekundären Verband, der vor dem Austrocknen der Wunde schützt und den Verband auf der Wunde fixiert.
- Bei Verbindungen dritten Grades,
- Schmalen tiefen Wunden oder Fisteln

Vorsichtsmaßnahmen

L-Mesitran Net kann bei kontaminierten und kolonisierten Wunden verwendet werden. Bei klinisch infizierten Wunden, sollt eine Anwendung nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Deine weitere Behandlung einer Infektion sollte entsprechend den lokalen Protokollen und unter ärztlicher Anleitung eingeteilt werden. Geeignete Sekundärverände sollen verwendet werden, um ein Austrocknen des Verbandes zu verhindern. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist.

Gebräuchsanleitung

1. Überprüfen und - falls erforderlich - reinigen Sie die Wunde nach lokalen Richtlinien.
2. Nehmen Sie den sterilen Verband aus der Verpackung.
3. Ziehen Sie den Verband von der klaren Polyesterplatte und legen Sie die frisch exponierte Seite auf die Wunde.
4. Bedekken und fixieren Sie die Wundauflage mit einem geeigneten Sekundärverband.
5. Überprüfen Sie die Wunde und das umliegende Gewebe regelmäßig gemäß den lokalen Richtlinien.
6. Im Falle einer Unträglichkeit gegenüber dem Verband oder einem seiner Bestandteile, entfernen Sie den Verband mit geeigneten Techniken und reinigen Sie den Bereich vorsichtig.

Verbandswechsel

L-Mesitran Net kann bis zu 5 Tage auf der Wunde belassen werden. Die Dauer hängt von der gebildeten Exsudatmenge ab, die bei jeder Wunde anders ist. Beim Wechseln des Verbandes kann die Wundauflage auf der Wunde verbleiben und nur der Sekundärverband erneuert werden. Sollte die Wundauflage zu trocken geworden sein, so kann das vollständig und schonende Entfernen durch Befeuchten erleichtert werden. Jede Wundauflage ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht nach dem auf der Packung angebrachten Verfallsdatum verwenden. Lagerung bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C. Vermeiden Sie direkt Sonneninstrahlung und Feuchtigkeit.

Verbandswisseling

Het verband kan maximal vijf dagen op de wond blijven, afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht en de behoeften van de wond. Waar nodig, kan het netverband op de wond blijven, terwijl het secundaire verband wordt vervangen. Indien het verband te droog geworden is, kan volledige en voorzichtige verwijdering van het verband geholpen worden door het een beetje vochtig te maken. Elk verband is voor eenmalig gebruik. Niet gebruiken na de vervaldatum.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

L-Mesitran Net kan gebruikt worden bij gecontamineerde en gekoloniseerde wonden. Echter wanneer wonden klinisch geïnfecteerd zijn, moet L-Mesitran Net alleen gebruikt worden indien passende medische begeleiding beschikbaar is. Eventuele verdere behandeling van de infectie dient te worden gestart volgens de lokale protocollen en onder medische begeleiding. Geschiede secundaire verbanden moeten worden gebruikt om het verband te fixeren en om uitdroging te voorkomen. Niet gebruiken indien de verpakking op eender welke wijze beschadigd is.

Gebruiksaanwijzing

1. Inspecteer en, indien nodig, reinig de wond volgens de geldende protocollen.
2. Verwijder het steriele verband uit de verpakking.
3. Verwijder het verband van de plastic ruglaag en plaatst het verband met de licht klevende zijde zachtjes op de wond.
4. Bedek en fixeer het verband met een geschilderd secundair verband.
5. Controleer de wond en het omliggende weefsel regelmatig volgens de geldende protocollen.
6. In het geval van een intolerantie voor het verband, of één van de componenten, verwijder het verband met behulp van geschikte technieken en maak het oppervlak zorgvuldig schoon.

Verbandswisseling

Het verband kan maximaal vijf dagen op de wond blijven, afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht en de behoeften van de wond. Waar nodig, kan het netverband op de wond blijven, terwijl het secundaire verband wordt vervangen. Indien het verband te droog geworden is, kan volledige en voorzichtige verwijdering van het verband geholpen worden door het een beetje vochtig te maken. Elk verband is voor eenmalig gebruik. Niet gebruiken na de vervaldatum.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

L-Mesitran Net is een steriel, open-weave mesh dressing coated with a hydroactive honey-hydrogel for use on acute and chronic wounds. L-Mesitran Net contains 20% medical grade honey, an acrylic polymer gel and water on a polyester mesh structure that allows passage of exudate through the dressing. L-Mesitran Net is to be used in conjunction with an appropriate secondary dressing, and can be used in conjunction with L-Mesitran Ointment and Soft. L-Mesitran Net is a multipurpose protective wound contact layer, where the honey-hydrogel coating provides some absorption and retention of exudate to help maintain a moist environment conducive to healing.

Indications

L-Mesitran Net is indicated for low to heavily exuding chronic wounds such as: pressure ulcers; superficial and partial thickness burns; venous, arterial and diabetic ulcers; fungating wounds. It is also indicated for acute wounds such as donor sites, surgical wounds, cuts and abrasions.

Contraindications

Do not use on individuals with a known sensitivity to the dressing or its components. L-Mesitran Net should not be used:

- Without a secondary dressing to prevent the dressing from drying out on the wound and to retain the dressing on the wound.
- On its own on heavily exuding wounds.
- On full thickness burns, deep, narrow cavities or sinuses.

Warnings and precautions

The dressing may be used on contaminated and colonized wounds. However where wounds are clinically infected, L-Mesitran Net should only be used providing appropriate medical supervision is sought. Any further treatment for infection should be initiated as per local protocols and under medical guidance. Appropriate secondary dressings should be used to prevent the dressing from drying out whilst in place. Do not use if the packaging is damaged or compromised in any way.

Instructions for use

1. Inspect and if necessary, cleanse the wound as per local protocols.
2. Remove the sterile dressing from the pouch.
3. Peel the dressing off the clear plastic backing sheet and apply the freshly-exposed side to the wound.
4. Cover and secure with the appropriate secondary dressing.
5. Inspect the wound and the surrounding tissue regularly, as per local protocols.
6. In the event of an intolerance to the dressing or one of its components, remove the dressing using appropriate techniques and clean the area carefully.

Frequency of change

The dressing can remain in place for up to five days, dependent upon the amount of wound exudate and the needs of the wound. Where appropriate, L-Mesitran Net may remain in place while the secondary dressing is changed. Complete and gentle removal of the dressing may be aided by irrigation should the dressing become too dry. Each dressing is for single use. Do not use after expiry date.

Store between 5°C and 25°C. Avoid direct sunlight and moisture.

ESPAÑOL

L-Mesitran Net

Descripción del producto

L-Mesitran Net es un apósito estéril de malla de tejido abierto, recubierto con hidrogel - miel hidroactiva para su uso en heridas agudas y crónicas. L-Mesitran Net contiene 20% de miel, un gel de polímero acrílico y agua en una estructura de malla de poliéster que permite el paso de exudado a través del apósito. L-Mesitran Net está indicado para ser utilizado en combinación con un apósito secundario adecuado y puede ser utilizado en combinación con L-Mesitran Pomada y L-Mesitran Soft. L-Mesitran Net es un apósito multipropósito protector para heridas, donde la capa de miel-hidrogel proporciona absorción y retención del exudado para ayudar a mantener un ambiente húmedo propicio para la cicatrización.

Indicaciones

L-Mesitran Net es indicado para heridas crónicas con baja a alta cantidad de exudado como: úlceras por presión, quemaduras de primer y segundo grado (espesor superficial y parcial); úlceras diabéticas, venosas y arteriales y heridas oncológicas. También está indicado para heridas agudas, tales como: zonas donantes para injertos de piel, heridas quirúrgicas, cortes y abrasiones.

Contraindicaciones

No utilizar en pacientes con sensibilidad conocida al apósito o a alguno de sus componentes.

- Sin un apósito secundario para prevenir que el vendaje se seque en la herida y retener el vendaje sobre esta misma.
- Por si solo en heridas altamente exudativas.
- En quemaduras de tercer grado (espesor completo), cavidades profundas y estrechas.
- Fistulas

Advertencias y precauciones

El paciente no debe utilizarlo si tiene una enfermedad que le impide la actividad física.

- Sin un apósito secundario para prevenir que el vendaje se seque en la herida y retener el vendaje sobre esta misma.
- Por si solo en heridas altamente exudativas.
- En quemaduras de tercer grado (espesor completo), cavidades profundas y estrechas.
- Fistulas

Instrucciones de uso

L-Mesitran Net está indicado para heridas crónicas con baja a alta cantidad de exudado como: úlceras por presión, quemaduras de primer y segundo grado (espesor superficial y parcial); úlceras diabéticas, venosas y arteriales y heridas oncológicas. También está indicado para heridas agudas, tales como: zonas donantes para injertos de piel, heridas quirúrgicas, cortes y abrasiones.

Contraindicaciones

No utilizar en pacientes con sensibilidad conocida al apósito o a alguno de sus componentes.

- Sin un apósito secundario para prevenir que el vendaje se seque en la herida y retener el vendaje sobre esta misma.
- Por si solo en heridas altamente exudativas.
- En quemaduras de tercer grado (espesor completo), cavidades profundas y estrechas.
- Fistulas

Indicaciones

L-Mesitran Net es indicado para heridas crónicas con baja a alta cantidad de exudado como: úlceras por presión, quemaduras de primer y segundo grado (espesor superficial y parcial); úlceras diabéticas, venosas y arteriales y heridas oncológicas. También está indicado para heridas agudas, tales como: zonas donantes para injertos de piel, heridas quirúrgicas, cortes y abrasiones.

# L-Mesitran® NET Hydro-active, honey-hydrogel coated, open weave mesh wound dressing

dicatione secondaria. Non utilizzare se la confezione è danneggiata o comunque compromessa.

## Istruzioni Per L'uso

1. Spezzonare e, laddove necessario, detergere la ferita secondo i protocolli di riferimento.

2. Estrane la medicazione sterile dalla confezione.

3. Staccare la medicazione dal foglio di plastica chiara che la riveste e applicare la parte appena scoperta sulla lesione.

4. Coprire e fissare con la medicazione secondaria adatta.

5. Spezzonare regolarmente la lesione e le cuta perilesionali, come prescritto dai protocolli di riferimento.

6. In caso di intolleranza alla medicazione o a uno dei suoi componenti, rimuovere la medicazione utilizzando le tecniche adeguate e detergere accuratamente l'area interessata.

## Frequenza Di Sostituzione

La medicazione può essere lasciata in situ fino a cinque giorni, a seconda della quantità di esudato e dello stato della lesione. Eventualmente è possibile lasciarla sulla medicazione secondaria. Qualora la medicazione si asciughi eccessivamente è possibile rimuoverla delicatamente e completamente aiutandosi mediante irrigazione della ferita. Ogni medicazione è monouso. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Conservare a una temperatura compresa fra 5°C e 25°C. Evitare la luce solare diretta e l'umidità.

## ESTI

### L-Mesitran Net

#### Toote Kirjeldus

L-Mesitran Net on sterilne, hõdroaktiivse mõehdrogeeliga kaetud lahtise koega võrkside, mis on mõeldud kasutamiseks rasketel ja kroonilistel haavanditel. L-Mesitran Net sisaldab 20% mett, akrüülpolüumeeregi ja vett polüürist võrgustikut, mis võimaldab eristel läbi sideme väljuda.

L-Mesitran Net on mõeldud kasutamiseks koos sobiva sekundarside sidemega ja seda saab kasutada kogu toodega L-Mesitran Ointment ja Soft. L-Mesitran Net on haavale asetatak multifunktsionaalne kaitsekits, mille mõehdrogeel kate tagab teatud märalt eritite imameesi ja kinnihoidmisse, mis aitab säälitada parane mist soodustavat niisket keskkonda.

#### Näidustused

L-Mesitran Net on näidustatud vahese kuni rohke eritisega krooniliste haavandise puhul; nt: survehaavandise, teise astme põletused, venoosed, arteriaalset ja dubbeletisid haavandise, seente põhjustatud haavandise. See on näidustatud ka raskete haavade korral, näiteks kohtades, kus nahk on doonorile eesmärgi eemaldatud, samuti kirurgiliste haavade, sisselööjate ja marastute korral.

#### Vastunäidustused

Mitte kasutada inimestel, kes on teadolevalt tundlikud sideme või selline komponendi suhtes. Toode L-Mesitran Net ei tohi kasutada:

- Ilma sekundarside sideme, vältimata sellele kuumivat haavale ja hoidmisest sidet haaval;
- Ainsa sidemena rohke eritisega haavadel;
- Kolmada astme põletustel, sügavatel kitsatsel öönsustel ega siinustel.

#### Hoiatused ja Ettevaatusabinõud

Sidet võib kasutada saastunud ja koloniseerunud haavadel. Kui haavades on kliniline infektsioon, võib toode L-Mesitran Net siiski kasutada üksnes nöutekohase meditsiinilise järelvalvalluse all. Taientavat infektsiooniravi tuleks teha vastavalt kohalikele protokollidele ja meditsiinilise juhendamise all. Haavale pandud sidemeid kuivamise vältimiseks tuleks kasutada sobivaid sekundarsidemuid. Mitte kasutada avatud või kahjustatud pakendi korral.

#### Kasutusjuhised

- Kontrollige ja vajaduse puhastage haava vastavalt kohalikele protokollede.
- Eemalda kohaleksik.
- Tõmmake side läbipaistva plastikust lehe küljel lahti ja kande haavale, nii et värske kattega pool on vastu haava.
- Katke ja kinnitage sobiva sekundarside sidemega.
- Kontrollige haava ja ümbritsevat kudet regulaarselt vastavalt kohalikele protokollede.
- Kui esineb talumatus sideme või mõne selle komponendi suhtes, eemaldage side sobivaid meetodeid kasutades ning purustage piirkond hoiki.

#### Vahetamisagedus

Side võib jääda haavale kuni viies päevaks, sõltuvat haavaeristite hulgast ja haava olukorrast. Vajaduse korral võib jätkata vöruga haavale ja vahetada ainult sekundaarside sidem. Kui side muutub liiga kuivaks, võib selle täielikku ja õrnaku eemaldamiseks olla kasu sideme riisutamiseni. Igas osas on mõeldud üherkordseks kasutamiseks. Mitte kasutada pärast aegumiskuupäeva. Säilitada temperatuuril 5 °C kuni 25 °C. Väldida otsest päikesevalgust ja niiskust.

## LATVIJOS

### L-Mesitran Net

#### Izstrādājuma Apraksts

L-Mesitran Net ir sterils, austi tīkla pārsējs ar hidroaktīvu medus hidrogēla pārkājumu. Izmantošanai uz akūtam un hroniskam brūcēm. L-Mesitran Net satur 20% medus, akūla polimēra gēlu un ūdeni uz poliester tīklietā auduma struktūru, kas ļauj eksudātam izķūt cauri pārsējam. L-Mesitran Net ir jāzīmē kopā ar atbilstošu sekundāru pārsēju, kā arī var izmantot kopā ar L-Mesitran Ointment un Soft. L-Mesitran Net ir universāls aizsargājošs brūces kontaktslānis, kura medus hidrogēla pārkājums veic absorbējus un eksudāta aiztures funkciju, tādējādi uzturot mitrumu, kas veicina sadžiņas procesu.

#### Indikācijas

L-Mesitran Net pārsējs ir hidroaktīvs hidrogēla pārkājums, kura eksudātā izdalījumi un no vietas līdz smagā pakāpei, piemēram: izgulējumi, viegli un vārtas pakāpes degumi, venozas, arteriālās un diabetiskās čūlas un nekrotiskās čūlas. Tās ir arī indikāti akūtam brūcēm, piemēram, donora vietām, kīrūgiskām brūcēm, griezumiem un nobräzumiem.

#### Kontraindikācijas

Nelietojot personām, kuras ir jutīgas pret pārsēju vai tā sastāvdāļām, L-Mesitran Net nedrīkst lietot:

- Bez sekundāru pārsēju, lai novērstu pārsēja izķūšanu uz brūces un lai norētu pārsēju uz tās;
- Vieni pāsu uz smagi uložīšām brūcēm;
- Uz dīzīļiem apdegumiem, dzīļiem, šauriem dobumiem vai sinusiem.

#### Bridinājumi Un Piesardzības Pasākumi

Pārsēju var izmantot ar infekciju val kolonizāciju brūcēm. Ja brūce ir kliniski inficēta, L-Mesitran Net drīkst izmantot tikai tad, ja tek nodrošināta atbilstoša medicinas persona uzraudzība. Visa turpmākā infekcijas arstēšanā ir jāuzsākt saskaņā ar vietējiem prakses noteikumiem un atbilstoši medicīniskajiem norādījumiem. Lai pārsējs uz brūces neizšķirt, ir jāzīmanto sekundāru pārsēju. Nelietojot to, ja iepakojums ir bojāts vai pakļauts jebkāda citā veida riskam.

#### Lietošanas Norādījumi

1. Pārbaudet brūci un, ja nepieciešams, dezinficējet to atbilstoši vietējiem prakses noteikumiem.

2. Izjemiet sterilo pārsēju no maisija.

3. Novēlēt pārsēju no caurspīdīgā plāstikā turētājloksnes un tikkov novilkot pusi uzfielet uz brūces.

4. Apsedziet un nostipriniet to ar atbilstošu sekundāru pārsēju.

5. Regulāri un atbilstoši vietējiem prakses noteikumiem pārbaudet brūci un apkārtošos audus.

6. Ja personas nepeles pārsēju vai kādu nu tā sastāvdāļā, nonjemiet to, pieletojot atbilstošas metodes, un rūpīgi dezinficējet vietu.

#### Maņas Biežums

Pārsējs var atsieties uz brūces par līdz pieciem dienām, kas ir atkarīgs no brūces eksudātā un brūces noplēpības. Ja pārsējs ir sastāvdāļā, pārsējs var palikt uz brūces sekundāru pārsēja mājas laikā. Ja pārsējs ir kļūcis pārāk sauss, tās pilnīgai un maijal nonjemšanai varat to samitrināt. Visi pārsēji ir prezentēti vienreizējā literācā. Neizmantojet tos pēc deriguma termina beigām.

Przechowywać w temperaturze 5–25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wilgoci.

6. W przypadku wystąpienia nietolerancji opatrunku lub jednego z jego składników, usunąć produkt z zastosowaniem odpowiednich technik i dokladnie oczyścić obszar.

#### Częstość zmiany opatrunku

Opatrunek może być niezmieniany przez maksymalnie pięć dni, zależnie od obfitości wysięku i charakteru ran. Zależnie od warunków, opatrunki pomocnicze mogą zostać zmieniony bez wymiany statki opatrunkowej Net. W pełnym i jednorazowym usunięciu opatrunku może pojawić się zmiana w poziomie zwilżenia, jeśli stanie się zbyt suchy. Każdy opatrunk jest przeznaczony do jednorazowego użytku. Nie używać po upływie daty ważności.

Przechowywać w temperaturze 5–25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wilgoci.

## ROSSIA

### L-Mesitran Net

#### Описание Продукта

L-Mesitran Net – стерильная повязка из скатого материала открытого плетения, покрытая гидроактивным медово-водным сплоем, для лечения острых и хронических ран. Полиэфирная сетка повязки L-Mesitran Net содержит 20 % меда, акриловый гель и вода, что позволяет экссудату легко просачиваться сквозь повязку. L-Mesitran Net может использоваться в сочетании с соответствующей вторичной повязкой и может использоваться с маслом L-Mesitran Ointment и Soft. L-Mesitran Net твердый торт из медового защитного слоя, контактирующий с раной, в котором покрытие из медово-водного геля обеспечивает определенное поглощение и удержание экссудата для сохранения влажной среды, способствующей заживлению раны.

#### Показания

L-Mesitran Net твердый торт из меда, покрытый гидроактивным сплоем, для лечения таких хронических ран как слабые, средние и сильные экссудации, как пролежни; поверхности и частично проникающие ожоги; венозные, пневматические и диабетические язвы; гноино-некротические раны. Кроме того, повязки показаны для лечения таких острых ран, как донорские участки, хирургические раны, порезы и ссадины.

#### Противопоказания

Не использовать на пациентах с известной чувствительностью к повязке или ее компонентам. Повязку L-Mesitran Net не следует накладывать:

- Be antirino tvarstio, kuris apsaugo nuo žālaidos išsaušimo ir išlaiko tvarstį ant žālaidos;
- Be nėko ant gausiai eksuduojančiu žālaidu;
- Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

#### Indikacijos

Draudžiama naudoti asmenims, kurie jautrūs tvarstui ar juo sudėtinėms dalimis. Draudžiama tarsi naudoti tvarstį:

- Be antirino tvarstio, kuris apsaugo nuo žālaidos išsaušimo ir išlaiko tvarstį ant žālaidos;
- Be nėko ant gausiai eksuduojančiu žālaidu;
- Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

#### Kontraindikacijos

Ne išnaudoti su patientais, kuriems tvarstas yra labai jautrūs tvarstui ar jis panaudoti tvarstui.

• Bez antirino tvarstio, kuris apsaugo nuo žālaidos išsaušimo ir išlaiko tvarstį ant žālaidos;

• Be nėko ant gausiai eksuduojančiu žālaidu;

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų, gilių, slaurų ertmių ar sinusų.

• Ant gilių nudegimų,